

(Parte Central)

Cytokin

Regulador de Crecimiento Vegetal

Líquido

Análisis Garantizado:

Citoquinina.....0.01%

Reg. RSCO: 008 / I / 96

Vigencia: Indeterminada

“NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS”, “NO SE REUTILICE ESTE ENVASE,
DESTRUYASE”, “NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

No. de lote:

Fecha de fabricación:

Contenido neto:

(logo Miller Chemical Mexico)

FORMULADO POR:
PTB para Miller Chemical & Fertilizer Corp.
P.O. Box 333, 120 Radio Road
Hanover, Pennsylvania 17331 E.U.A.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Miller Chemical de México S.A. de C.V
Laguna 24 Col. Ampliación Alpes.
Delegación Alvaro Obregón,
C.P. 01710
México, D.F.
Tel.: 56 80 72 20

Hecho en E.U.A.

Parte Izquierda

¡ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO !

INFORMACIÓN GENERAL

Cytokin es regulador de crecimiento a base de Citoquininas útil para mejorar el desarrollo y crecimiento radicular, la iniciación de las yemas, el amarre de flores, y la retención y el desarrollo de la fruta. Las Citoquininas son esenciales para los cultivos para inducir la división celular, la diferenciación celular, ensanchamiento celular y también la movilización de nutrientes. Las citoquininas también provocan un retraso de la senescencia y son indispensables para vencer la dominancia apical de los cultivos en producción.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Las personas que mezclen, preparen y apliquen este producto, deben usar: Camisa de manga larga y pantalón largo (overol), guantes y goggles / careta. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento.

Todos los usuarios deberán:

Lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle o tabaco o usar el baño. Quitarse la ropa inmediatamente si el producto traspasa el equipo de protección o después de usar el producto, lavarse perfectamente y ponerse ropa limpia. Antes de quitarse los guantes impermeables, lavarlos bien con agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Si hay contacto con los ojos o la piel:** enjuague con abundante agua por un mínimo de 15 minutos y acuda a un médico si las molestias persisten.
- **Si se inhala:** Retire a la persona afectada del área contaminada y recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado.
- **Si se ingiere:** Proporcione abundante agua, no induzca el vómito. Acuda a un médico si las molestias persisten.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MEDICO

- **Síntomas de sobre-exposición:** Irritación de la piel, ojos o vías respiratorias.
- **Tratamiento:** No existe antídoto específico, proporcione tratamiento sintomático.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de nutrientes vegetales o envases vacíos.

En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún material absorbente (polvo, aserrín, ceniza), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final.

Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparo la mezcla. (Salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). No aplicar en donde los mantos acuíferos sean poco profundos o los suelos sean muy permeables.

No pastorear en áreas recién tratadas. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (no almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o animal).

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa o forrajes. Almacénese en un lugar fresco y seco, nunca a la intemperie. No se deje al alcance de los niños o animales domésticos.

AVISO DE GARANTIA.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, Miller Chemical de México, S.A. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta en su envase original y sellado y no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo indebido de este producto, por ser operaciones fuera de nuestro control.

Ligeramente Tóxico

Parte Derecha

INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACION!

METODO DE PREPARACIÓN Y APLICACION DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION: AGITESE BIEN ANTES DE SU USO.

Para uso en general, mezcle 1 parte de **Cytokin** con 400 partes de agua y aplíquese en aspersión al follaje hasta que esté bien mojado, casi hasta el punto de escurrimiento. Para lograr resultados óptimos, **Cytokin** debe ser aplicado por la mañana o después de las 4 p.m. Aplíquese con suficiente agua para lograr una cobertura completa de todo el follaje.

SOLUCION PARA EL TRASPLANTE: Prepárese una solución de 1 parte de **Cytokin** a 500 partes de agua. Empape las raíces de las plantas a trasplantar con la solución de trasplante o empape el suelo alrededor de cada planta para lograr una buena saturación de la zona radicular.

DOSIS DE APLICACION EN ASPERSION: Aplíquese **Cytokin** con la dosis de 1/2 litro por hectárea semanalmente, comenzando una semana después del trasplante o al estadío de 4 a 6 hojas verdaderas, continuando las aplicaciones quincenales hasta un mes antes de la cosecha final.

RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO: Hortalizas y frutas. Para mejorar el crecimiento radicular, la iniciación de botones, la fijación floral y el desarrollo de la fruta en pepino, sandía, melón, calabaza, chile, coliflor, uvas, etc., aplíquese 1/2 litro por hectárea en las siguientes épocas: apertura de las yemas, una semana después de la caída de los pétalos, una semana antes de la caída de los frutos y mensualmente durante el crecimiento y desarrollo de los frutos.

Algodón: Para aumentar la fijación floral, la retención y el desarrollo de las bellotas, aplíquese 1/2 litro por hectárea durante la primera floración y repítase la aplicación de 1/2 litro por hectárea dos semanas después.

Frutales y bayas. Aplíquese 1/2 litro a 2 litros por hectárea temprano en la floración, continuando las aplicaciones semanalmente o mensualmente hasta las 2 a 4 semanas antes de la cosecha.

Hortalizas: iniciar las aplicaciones al primera semana después del trasplante o cuando tenga de 5 a 6 hojas, a dosis de 1/2 litro / Ha y continuar semanalmente las aplicaciones hasta 3 semanas antes de la cosecha.

INCOMPATIBILIDAD

- **Cytokin** ® es compatible con la mayoría de los plaguicidas. Si se desea hacer alguna mezcla de tanque, deberá hacerse una prueba previa a fin de demostrar su eficacia y asegurar que no haya efectos fitotóxicos.

- No mezcle **Cytokin** ® con caldo Bordelés, citrolina, Azufre de cal, o materiales altamente alcalinos.

FITOTOXICIDAD

- **Cytokin** no es fitotóxico siempre y cuando sea aplicado en los cultivos, las dosis aquí recomendadas y siguiendo las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración.